

111 年度莫德納 (Spikevax) COVID-19 雙價疫苗(原病毒株 /Omicron BA.4/5) 校園集中接種相關事宜

因應COVID-19疫苗接種，敬請任課老師與導師協助執行接種作業。

● 相關作業如下：

- 一、請同學前一晚及早就寢，務必進食早、午餐。
- 二、接種日期及地點：111年12月23日(星期五)，體育館。
- 三、體育館於當日下午暫停使用，造成不便敬請見諒。
- 四、各班任課老師協助服務股長於入場時間之前，提醒同學帶著健保卡、小黃卡和筆(未攜帶健保卡及小黃卡者無法接種)，由服務股長整隊將有意願施打同學帶往體育館韻律教室外，依座號排隊等待。無意願施打者，由任課教師留原班督導。
- 五、施打流程：依座號集合完畢→發下意願書→填寫接種前自我評估表→量體溫並記錄於自我評估表→醫師評估→疫苗施打→到休息區觀察至班上最後一人接種後加15分鐘→由服務股長統一帶回教室再觀察休息15分鐘。****多飲水可減緩不適症狀****

● 接種須知

- 一、接種禁忌：對於疫苗所含活性物質或賦形劑有嚴重過敏反應史，或先前接種 Spikevax 病毒原型株/雙價疫苗(原病毒株/Omicron BA.1) 疫苗劑次發生嚴重過敏反應者，不予接種。我國衛生福利部傳染病防治 諮詢會預防接種組(ACIP)建議，於完成基礎劑(第一、二劑)或前一劑追加劑(第三劑)後，間隔至少12週(84)接種；確診者需自確診日起至少間隔3個月時間再接種疫苗。
- 二、疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，通常輕微並於數天內消失。接種疫苗後可能有發燒反應($\geq 38^{\circ}\text{C}$)，一般約48小時可緩解。
- 三、留意班上學生接種後情形，因應學生因疫苗接種後狀況採取相關措施，接種後兩週調整教學型態及減少激烈教學活動。

● 接種流程時間預定表

接種時間視現場速度調整，敬請配合與見諒，謝謝

入場時間	班級	施打人數	入場時間	班級	施打人數
13:10	101、102 115、315	27	14:20	207、208 209	27
13:20	301、302 303	35	14:30	210、211 212、213	32
13:30	304、305 306	27	14:40	214、103 104	30
13:40	307、308 309、310 311	31	14:50	105、106 107	26
13:50	312、313 314	29	15:00	108、109 110、111	29
14:00	201、202 203、215	36	15:10	112、113 114	22
14:10	204、205 206	33			